

Tabla 6.

Políticas concretas

País	Uso del cubrebocas	Nivel de obligatoriedad	Comentarios (Masks 4 all)	Índice de severidad	Nivel 1 (1-25 puntos)	Nivel 2 (25-50) puntos)	Nivel 3 (50-75) puntos)	Nivel 4 (75-85) puntos)	Nivel 5 (85-100 puntos)
Estados Unidos	50%	Bajo	Ciertas regiones	2.45	1 feb 20	12 mar 20	16 mar 20	16 nov 20	
Reino Unido	16%	Ciertos lugares. Junio-agosto de 2020 en Inglaterra	Todo el país lo requiere (transporte público, tiendas y supermercados)	2.86	23 ene 20	19 mar 20	21 mar 20	23 mar 20	6 ene 21
Francia	34%	Amplio (julio de 2020)	Todo el país lo requiere (todo espacio público cerrado)	2.86	23 ene 20	28 feb 20	1 mar 20	16 mar 20	17 mar 20
Nueva Zelanda	36.7%	Ciertos lugares	No, pero se recomienda	1.59	23 ene 20	16 mar 20	21 mar 20	22 mar 20	24 mar 20
Japón	77%	Bajo	No se requiere, pero hay uso universal	1.86	23 ene 20	20 feb 20	28 feb 21		
RP China	83%	Ciertos lugares	No se requiere, pero hay uso universal	3.59		23 ene 20	26 ene 20	1 feb 20	
Corea del Sur	94%	Bajo	No se requiere, pero hay uso universal	2.59	31 ene 20	4 feb 20	23 feb 20	23 mar 20	
Vietnam	91%	Amplio y estricto	Todo el país lo requiere (estricto en todo lugar público)	2.81	25 ene 20	30 ene 20	22 mar 20	28 mar 20	
México	58%	Ciertos lugares	Todo el país lo requiere (sin embargo no hay sanciones claras)	2.18	21 feb 20	12 mar 20	26 mar 20	23 abr 20	1 abr 20
Turquía	10%	Amplio y estricto	Todo el país lo requiere (transporte público, tiendas, supermercados y lugares concurridos). En algunas regiones se multa a quien no lo porta.	2.59	24 ene 20		16 mar 20	29 mar 20	
Tailandia	95%	Amplio y estricto	Todo el país lo requiere (estricto en todo lugar público)	2.27	6 mar 20	10 mar 20	21 mar 20	3 abr 20	

Fuentes: Elaboración propia con base en: LCT Responses to Covid (s/f); Ipsos (2020); Gray et al. (2020); Leffler et al. (2020); Imperial College London (2020); Lim et al. (2020); Masks 4 All (2021); Khaosod English (2020). En cuanto al uso de cubrebocas, para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, RP China, Vietnam y México los datos son del 9 al 12 de abril de 2020. Aunque en los siete países se aprecia un incremento entre el 12-14 de marzo hasta la medición del 9 al 12 de abril, la gráfica permite ver que el uso del cubrebocas era muy elevado en la primera medición en Vietnam 88%, en Japón 61% y en RP China 89%. Mientras tanto, el resto de los siete países presentaban cifras mucho más bajas: Francia 6%, Reino Unido 4%, Estados Unidos 12% y México 31%. Grey et al (2020: 200) observan la resistencia en general en cuatro países occidentales al uso del cubrebocas (Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Austria). En cuanto al uso de cubrebocas, Leffler et al (2020) agrupan a los países en tres: los que adoptaron los cubrebocas de forma temprana, entre ellos Japón, Vietnam, Corea del Sur y Tailandia; más aún, en estos cuatro casos y el de RP China destaca además su uso común previo a la pandemia y sin necesidad de una recomendación oficial. Advierten que tanto Turquía, como Estados Unidos, México y Francia recomendaron el uso de cubrebocas más de 30 días después de la exposición al virus; más aún, destacan la falta de obligatoriedad en Estados Unidos y el hecho de que Francia no haya considerado el uso de

cubre bocas durante la emergencia. En cuanto al índice de severidad de medidas gubernamentales, un estudio del Imperial College de Londres de octubre de 2020 reporta a México como el país con medidas más severas entre 27 analizados con un score de 74 puntos. Entre los países analizados en este trabajo, le siguen Reino Unido con 68 puntos, Estados Unidos con 63, Corea del Sur con 55, RP China con 54, Vietnam con 52, Francia con 47, Tailandia con 44 y Japón con 31. En cuanto al uso del cubrebocas, el dato de Nueva Zelanda proviene de un estudio aplicado del 25 al 29 de abril de 2020 y la respuesta corresponde a personas que usaron cubrebocas en algún momento en los últimos 7 días; sin embargo, sólo el 12.1% reportaba usarlo cotidianamente (Gray et al., 2020: 201). Para el dato del índice de severidad, se hizo una revisión, país por país, en 22 momentos entre el 23 de enero de 2020 y el 23 de junio de 2021, período que abarca el mapa virtual del OxCGRT. Entre el 23 de enero y el 26 de marzo, el período en que sucedieron los cambios más rápidos, se hicieron 7 mediciones. Luego, hubo 15 mediciones, cada una correspondiente al día 23 de cada mes (del 23 de abril de 2020 al 23 de junio de 2021). Se asignó 0 puntos para el índice de severidad de 0-1; se asignó un punto para el índice de severidad entre 1-25 puntos; dos puntos se asignaron a un índice de severidad de 25-50 puntos; tres puntos para un índice de 50-75 puntos; cuatro puntos para un índice de 75-85 puntos, y 5 puntos para un índice de 85-100. La suma se dividió para cada país entre 22 (mediciones). Para el caso de Tailandia, se asegura que es el país cuyos ciudadanos usan más el cubrebocas entre los seis países de ANSEA (Khaosod English, 2020);